

Nomenclatuurwijziging RIZIV

RUG

lumbosacrale orthesen

thoracolumbosacrale orthesen

vanaf 01/10/2026

PREFAB LSO

INDICATIES DIE RECHT GEVEN OP EEN TERUGBETALING

HERNIEUWBAAR

- Vertebrale tumoren of pathologische wervelfracturen
- Infecties wervelkolom: conservatieve behandeling van spondylodiscitis (geen hooggradige destructie van wervellichaam en wanneer chirurgie niet geïndiceerd is)
- **Postoperatief:** Radiografisch geobjectiverde pseudarthrose en/of loslating van instrumentatiemateriaal

NIET HERNIEUWBAAR

- Traumatische wervelfractuur conservatief behandeld (stabiele fractuur, type burstfractuur).
- Conservatieve behandeling van actieve spondylolyse/spondylolisthese bij skeletaal immature patiënten
- **Postoperatief:** Implantatie van instrumentatie materiaal van wervels (fusie of osteosynthese)
 - bij patiënten met gedocumenteerde osteoporose waarbij botopbouwende of antiresorptieve farmacologische behandeling ondergaan of hebben ondergaan

Voorwaarden maatwerk verstrekking:

- Aanwezigheid van ernstige anatomische afwijking waardoor een prefab toerusting niet mogelijk is
- Duidelijk/uitgebreide orthopedische motivatie met vermelding van genomen maten: vergelijking met maattabellen van (2) prefab alternatieven. Het minimale verschil moet 5 cm zijn.
- Toelichten met extra foto's

MAATWERK LSO

INDICATIES DIE RECHT GEVEN OP EEN TERUGBETALING

HERNIEUWBAAR

- Vertebrale tumoren of pathologische wervelfracturen
- Infecties wervelkolom: conservatieve behandeling van spondylodiscitis (geen hooggradige destructie van wervellichaam en wanneer chirurgie niet geïndiceerd is)
- **Postoperatief:** Radiografisch geobjectiveerde pseudarthrose en/of loslating van instrumentatiemateriaal

Indicaties maatwerk lumbostaat tijk & metaal

- Gevorderde (facet/disc) arthrose
- Degeneratieve spondylolisthese
- spinaalkanaalstenose

NIET HERNIEUWBAAR

- Traumatische wervelfractuur conservatief behandeld (stabiele fractuur, type burstfractuur).
- Conservatieve behandeling van actieve spondylolyse/spondylolisthese bij skeletaal immature patiënten
- **Postoperatief:** Implantatie van instrumentatie materiaal van wervels (fusie of osteosynthese)
 - bij patiënten met gedocumenteerde osteoporose waarbij botopbouwende of antiresorptieve farmacologische behandeling ondergaan of hebben ondergaan

Voorwaarden maatwerk verstrekking:

- Aanwezigheid van een ernstige anatomische afwijking waardoor een prefab toerusting niet mogelijk is
- Duidelijk/uitgebreide orthopedische motivatie met vermelding van genomen maten: vergelijking met maattabellen van (2) prefab alternatieven. Het minimale verschil moet 5 cm zijn.
- Toelichten met extra foto's

PREFAB TLISO: IMMOBILISEREND TYPE TAYLOR

INDICATIES DIE RECHT GEVEN OP EEN TERUGBETALING

HERNIEUWBAAR

- Vertebrale tumoren of pathologische wervelfracturen
- Infecties wervelkolom: conservatieve behandeling van spondylodiscitis (geen hooggradige destructie van wervellichaam en wanneer chirurgie niet geïndiceerd is)
- **Postoperatief** na instrumentatie van dorsale en/of lumbale wervelzuil: in geval van radiografisch geobjectiveerde pseudoartrose en/of loslating van instrumentatiemateriaal

NIET HERNIEUWBAAR

- Traumatische wervelfractuur conservatief behandeld (stabiele fractuur, type burstfractuur).
- **Post operatief:** Postoperatief na instrumentatie van de dorsale en/of lumbale wervelzuil:
 - In geval van multilevel fusieoperaties > 4 niveaus of waarbij in totaal (inclusief voorgaande ingrepen) > 4 aangrenzende niveaus aan elkaar gefusioneerd zijn.
 - Bij patiënten met gedocumenteerde osteoporose die een botopbouwende of antiresorptieve farmacologische behandeling ondergaan of hebben ondergaan

Voorwaarden maatwerk verstrekking:

- Aanwezigheid van een ernstige anatomische afwijking waardoor een prefab toerusting niet mogelijk is
- Duidelijk/uitgebreide orthopedische motivatie met vermelding van genomen maten: vergelijking met maattabellen van (2) prefab alternatieven. Het minimale verschil moet 5 cm zijn.
- Toelichten met extra foto's

MAATWERK TLSO: IMMOBILISEREND

Alle 8 bestaande maatwerk-verstrekkingen geschrapt, vervangen door 2 nieuwe codes (656390 en 656456) met strikt afgelijnde indicaties en duidelijke exclusies.

HERNIEUWBAAR

- Vertebrale tumoren of pathologische wervelfracturen
- Infecties wervelkolom: conservatieve behandeling van spondylodiscitis (geen hooggradige destructie van wervellichaam en wanneer chirurgie niet geïndiceerd is)
- Postoperatief na instrumentatie van dorsale en/of lumbale wervelzuil: in geval van radiografisch geobjectiveerde pseudoartrose en/of loslating van instrumentatiemateriaal

NIET HERNIEUWBAAR

- Traumatische wervelfractuur conservatief behandeld (stabiele fractuur, type burstfractuur).
- Postoperatief na instrumentatie van de dorsale en/of lumbale wervelzuil:
 - In geval van multilevel fusieoperaties > 4 niveaus of waarbij in totaal (inclusief voorgaande ingrepen) > 4 aangrenzende niveaus aan elkaar gefusioneerd zijn.
 - Bij patiënten met gedocumenteerde osteoporose die een botopbouwende of antiresorptieve farmacologische behandeling ondergaan of hebben ondergaan

Belangrijke exclusies:

(1) louter fixeren (=osteosynthese) bij patiënten zonder osteoporose.

PREFAB TLSO: CORRIGEREND TYPE HYPEREXTENSIE

INDICATIES DIE RECHT GEVEN OP EEN TERUGBETALING

NIET HERNIEUWBAAR

- Osteoporose met (sequellen van) indeukingsfracturen en een kyfotisch gangpatroon met verhoogd valrisico. Bij patiënten met gedocumenteerde osteoporose die een botopbouwende of antiresorptieve farmacologische behandeling ondergaan of hebben ondergaan.
- Conservatieve behandeling van de ziekte van Scheuermann bij skeletaal immature patiënten met een thoracale kyfose $\geq 55^\circ$ gemeten volgens de methode van Cobb.

Voorwaarden maatwerk verstrekking:

- Aanwezigheid van een ernstige anatomische afwijking waardoor een prefab toerusting niet mogelijk is
- Duidelijk/uitgebreide orthopedische motivatie met vermelding van genomen maten: vergelijking met maattabellen van (2) prefab alternatieven. Het minimale verschil moet 5 cm zijn.
- Toelichten met extra foto's

MAATWERK TLSO: CORRIGEREND

Alle bestaande verstrekkingen geschrapt, vervangen door 2 nieuwe codes onderscheiden naar leeftijdsgroep (immatuur vs matuur) en specifieke Cobb-hoeken.

SKELETAAL IMMATURE PATIËNTEN < 21 JAAR 656471-656482

- Conservatieve behandeling van scoliose bij skeletaal immature patiënten tot de 21ste verjaardag met:
 - Een aangetoonde neurologische of neuromusculaire aandoening resulterend in asymmetrische, te hoge of te lage spierspanningen van de romp
 - Een adolescente idiopathisch scoliose die een radiografische curve met hoek van Cobb $\geq 20^\circ$ vertonen
- Conservatieve behandeling van de ziekte van Scheuermann bij skeletaal immature patiënten tot de 21ste verjaardag met een thoracale kyfose $\geq 55^\circ$ gemeten volgens de methode van Cobb.

SKELETAAL MATURE PATIËNTEN $\geq$ 21 JAAR 656493-656504

- Conservatieve behandeling van scoliose bij skeletaal mature patiënten vanaf 21ste verjaardag met
 - Een aangetoonde neurologische of neuromusculaire aandoening resulterend in asymmetrische, te hoge of te lage spierspanning en die radiografische curves met een hoek van Cobb $\geq 30^\circ$ vertonen OF
 - Een evolutieve adolescent idiopathisch scoliose of degeneratieve lumbale scoliose die radiografische curves met hoek van Cobb $\geq 45^\circ$ vertonen.
- Conservatieve behandeling van de ziekte van Scheuermann bij skeletaal mature patiënten vanaf de 21ste verjaardag met een thoracale kyfose $\geq 70^\circ$ gemeten volgens de methode van Cobb.

Belangrijk: Verstrekking 656471-656482 is ook vergoedbaar wanneer zij hernieuwd wordt na een eerdere aflevering waarbij de rechthebbende voldeed aan de hierboven opgenomen indicaties. Kortom, **deze indicaties zijn enkel van toepassing bij de start van de corrigerende behandeling.**